

動物用医薬品

承認指令書番号

25 動薬第 2359 号

貯 法 凍結を避け冷所保存，密封容器

オキシトシン注射液

要指示医薬品 指定医薬品

動物用 **アトニン-O**

ATONIN®O

【本質の説明又は製造方法】

本剤は、オキシトシンを有効成分とする注射剤です。オキシトシンの生物学的活性は子宮収縮作用、乳汁射出作用等であり、生体内では視床下部で生成され、下垂体後葉に貯蔵され、吸乳刺激や分娩時の子宮頸部・腔の伸展などの刺激に応じて血中に放出されます。

【成分及び分量】

品 名	動物用アトニン-O
有効成分	オキシトシン
分量	1 mL 中 10 オキシトシン単位

【効能又は効果】

馬：陣痛微弱

牛：陣痛微弱，子宮脱，胎盤停滞，ミイラ変性胎児の排出，射乳促進

豚：陣痛微弱，射乳促進

犬：陣痛微弱

猫：陣痛微弱

【用法及び用量】

1 日 1 回 1 頭当たり下記の量を静脈内，筋肉内又は皮下に注射する。

馬：20 ～ 150 単位

牛：20 ～ 150 単位

豚：20 ～ 50 単位

犬：5 ～ 30 単位

猫：5 ～ 30 単位

【使用上の注意】

（基本的事項）

1. 守らなければならないこと

（一般的注意）

- ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。

（取扱い及び廃棄のための注意）

- ・アンプル開封後は，速やかに使用すること。
- ・使用済みの容器は，地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は，環境や水系を汚染しないように注意し，地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・使用済みの注射針は，針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は，産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。
- ・注射器具は滅菌又は煮沸消毒されたものを使用すること。薬剤により消毒をした器具又は他の薬剤に使用した器具は使用しないこと（ガス滅菌によるものを除く）。なお，乾熱，高压蒸気滅菌又は煮沸消毒等を行った場合は，室温まで冷えたものを使用すること。

- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光，高温及び凍結を避けること。

2. 使用に際して気を付けること

（使用者に対する注意）

- ・誤って注射された者は，直ちに医師の診察を受けること。
- ・妊娠中又は妊娠している可能性のある女性には，注射作業を行わせないこと。

（対象動物に関する注意）

- ・本剤の投与前には健康状態について検査し，使用の可否を決めること。
- ・副作用が認められた場合には，速やかに獣医師の診察を受けること。

（専門的事項）

①対象動物の使用制限等

- ・本剤は妊娠等により子宮頸管が緊縮している場合には投与を避けること。

②重要な基本的注意

- ・本剤を静脈内注射する場合には，緩徐に注入すること。

【薬理学的情報等】

（薬効薬理）

- ・子宮筋に作用して子宮の律動的な収縮を起こさせる。
- ・授乳期の乳腺に作用して射乳を起こさせる。

【包装】

動物用アトニン-O：5 mL × 10 本（アンプル）

【製品情報お問い合わせ先】

あすかアニマルヘルス株式会社

〒108-8532 東京都港区芝浦二丁目5番1号

TEL：03-5439-4188

【電子添付文書情報】

以下より，添付文書情報が確認できます。



あすかアニマルヘルス HP

農林水産省

動物医薬品検査所データベース



製造販売元

あすかアニマルヘルス株式会社

東京都港区芝浦二丁目5番1号

TEL. 03-5439-4188 FAX.03-5439-4191

獣医師，薬剤師等の医薬関係者は，本剤による副作用などによると疑われる疾病，障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において，保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは，上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに，農林水産省動物医薬品検査所（<https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>）にも報告をお願いします。