


注射用血清性性腺刺激ホルモン

動物用セロトロピン[®]

SEROTROPIN[®]



動物用セロトロピン®

SEROTROPIN®

本剤は血清性性腺刺激ホルモンの注射用凍結乾燥製剤であり、用時、添付の溶解液により溶解して用います。血清性性腺刺激ホルモンはウマ血清由來の糖蛋白質であり、雌性動物に対しても主に卵胞刺激ホルモン(FSH)様作用を持ち、黄体形成ホルモン(LH)様作用は弱く、雄性動物に対しては精細管上皮細胞を刺激し、精子の形成を促します。			
成分及び分量	有効成分	血清性性腺刺激ホルモン	
	分量	1アンプル中1000単位	
	添付溶解液	1アンプルに対し0.6%塩化ナトリウム溶液5mL1アンプル	
効能又は効果	馬(雌):卵胞発育障害(卵巣発育不全、卵巣静止、卵巣萎縮) 牛(雌):卵胞発育障害(卵巣発育不全、卵巣静止、卵巣萎縮)、多排卵誘起 めん羊(雌):卵胞発育障害(卵巣発育不全、卵巣静止、卵巣萎縮)、多排卵誘起 豚(雌):卵胞発育障害(卵巣発育不全、卵巣静止、卵巣萎縮)、分娩後の発情誘起、多排卵誘起 犬(雌):卵胞発育障害(卵巣発育不全、卵巣静止、卵巣萎縮)、無発情期における発情誘起 馬(雄):精巢機能減退(精子減少症、軽度の精子死滅症) 牛(雄):精巢機能減退(精子減少症、軽度の精子死滅症) 豚(雄):精巢機能減退(精子減少症、軽度の精子死滅症) 犬(雄):精巢下降不全		
用法及び用量	添付の溶解液に溶解し、1日1回1頭当たり血清性性腺刺激ホルモンとして下記の量を筋肉内又は皮下に注射し、必要に応じて反復投与する。 馬:500~2,000単位 牛:500~2,000単位 (多排卵誘起の場合2,000~4,000単位) めん羊:500~1,000単位 (多排卵誘起の場合1,000~2,000単位) 豚:400~1,000単位 (多排卵誘起の場合1,000~2,000単位) 犬:50~200単位		
使用上の注意	<p>(基本的事項)</p> <p>1. 守らなければならないこと</p> <p>(一般的な注意)</p> <ul style="list-style-type: none"> 本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。 <p>(取扱い及び廃棄のための注意)</p> <ul style="list-style-type: none"> 本剤は、溶解液に混和後直ちに振盪溶解し、速やかに使用すること。 		
		薬理的情報等	
		<ul style="list-style-type: none"> FSH作用を示し、LH(あるいはICSH)作用を併有する。 雌性動物に対し、卵胞の成熟を促し、排卵を誘発する(ラット・マウス)。 雄性動物に対し、睾丸の発育、特に精細管上皮細胞の増殖を促す(ラット・マウス)。 	
		包装	1000単位×10(アンプル) [0.6%塩化ナトリウム溶液5mL×10(アンプル)添付]
		貯法	遮光・冷所保存、密封容器
		使用期限	3年



製造販売元

あすかアニマルヘルス株式会社

東京都港区芝浦二丁目5番1号

TEL. 03-5439-4188 FAX. 03-5439-4191